

Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas 2017

Grupo Alvo	Idade	BCG	Hepatite B	Penta/DTP	VIP/VOP	Pneumocócia 10V (conjugada) ^a	Rotavírus Humano	Meningocócica C (conjugada) ^a	Febre Amarela	Hepatite A ^b	Tríplice Viral	Tetra viral ^c	HPV	Pneumocócica 23V	Varicela ^d	Dupla Adulto	dTpa ^e
Crianças	Ao nascer	Dose única	Dose ao nascer														
	2 meses			1ª dose	1ª dose (com VIP)	1ª dose	1ª dose										
	3 meses							1ª dose									
	4 meses			2ª dose	2ª dose (com VIP)	2ª dose	2ª dose										
	5 meses							2ª dose									
	6 meses			3ª dose	3ª dose (com VIP)												
	9 meses								Uma dose								
	12 meses					Reforço		Reforço			1ª dose						
	15 meses			1º reforço (com DTP)	1º reforço (com VOP)					Uma dose (15 meses até 23 meses)		Uma dose					
	4 anos			2º reforço (com DTP)	2º reforço (com VOP)				Reforço						Uma dose		
5 anos													Dose inicial				
9 anos																	
Adolescente	10 a 19 anos		3 doses (verificar a situação vacinal)					01 reforço ou dose única (verificar a situação vacinal 12 a 13 anos)	Uma dose e um reforço (verificar a situação vacinal)				2 doses (meninas de 9 a 14 anos) 2 doses (meninos de 12 a 13 anos)			Reforço a cada (10 anos)	
Adulto	20 a 59 anos		3 doses (verificar a situação vacinal)						Uma dose e um reforço (verificar a situação vacinal)		2 doses (20 a 29 anos) 1 dose (30 a 49 anos)					Reforço a cada (10 anos)	
Idoso	60 anos ou mais		3 doses (verificar a situação vacinal)						Uma dose e um reforço (verificar a situação vacinal)					Reforço		Reforço a cada (10 anos)	
Gestante			3 doses (verificar a situação vacinal)													3 doses (verificar a situação vacinal)	Uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana

^aNota: ^aAdministrar Uma dose da vacina Pneumocócia 10V (conjugada) e da vacina Meningocócica C (conjugada) em crianças entre 2 e 4 anos, que não tenham recebido o reforço ou que tenham perdido a oportunidade de se vacinar anteriormente.

^bAdministrar Uma dose da vacina hepatite A, em crianças entre 2 e 4 anos, que tenham perdido a oportunidade de se vacinar anteriormente.

^cA vacina tetra viral corresponde à segunda dose da tríplice viral e à dose da vacina varicela. Crianças entre 2 e 4 anos que não apresentarem nenhuma dose da vacina com componente varicela, poderão receber Uma dose.

^dVaricela administrar uma dose aos 4 anos(até aos 4 anos 11 meses e 29 dias). Corresponde à 2ª dose da vacina varicela, considerando a dose de tetra viral aos 15 meses de idade. Crianças entre 2 anos a 4 anos 11 meses e 29 dias não vacinadas com tetra viral, administrar duas doses da vacina varicela (atenuada), com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, sendo que a 2ª dose deve ser administrada, preferencialmente aos 4 anos.

^eGestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante o período gestacional, administrar Uma dose de dTpa no puerpério, o mais precocemente possível. A vacina dTpa também será ofertada para profissionais de saúde que atuam em maternidade e em unidade de internação neonatal (UTI/UCI convencional e UCI canguru) atendendo recém-nascidos e crianças menores de 1 ano de idade.